

ThermaCare Schmerz-Gel

Wirkstoff: Felbinac, 1,1'-Iminobis (2-propanol) -Salz.

Zusammensetzung: 1g Gel enthält: 48,8 mg Felbinac, 1,1'-Iminobis (2-propanol) -Salz entsprechend 30 mg Felbinac.

Sonstige Bestandteile: Carbomer, 1,1'-Iminobis (2-propanol), Ethanol, gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Für Erwachsene und Heranwachsende ab 14 Jahren zur symptomatischen Therapie von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen im Bereich der Extremitäten infolge stumpfer Traumen; entzündlichen weichteilrheumatischen Erkrankungen wie Tendinitis, Tendosynovitis, Bursitis.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeiten gegen Felbinac oder sonstige Bestandteile des Präparates sowie andere NSAR, Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindalter. Keine Anwendung bei Patienten, die auf NSAR oder Analgetika mit Asthmaanfällen, Hautreaktionen, akuter Rhinitis, nephrotischem Syndrom oder interstitieller Nephritis überempfindlich reagiert haben.

Nebenwirkungen: Häufig leichte lokale Erytheme, Dermatitis und Pruritus. Bei entsprechend disponierten Patienten in Einzelfällen Auslösung von Asthmaanfällen möglich.

Pfizer Consumer Healthcare, 10922 Berlin
2016-05
